

Coleus, Premium Sun Coral Candy

(Solenostemon scutellarioides)

Однолетние растения (обновлено 12.12.24)

Общая информация

| Расположение    | Период цветения | Высота                  | Ширина                  | Расстояние между растениями |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Тень, Солнечное | -               | 10-16 в .<br>(25-41 cm) | 12-14 в .<br>(30-36 cm) | 8-10 в .<br>(20-25 cm)      |

Прорастание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | До пикировки (недель) | дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания | pH/EC (1:2) субстрат для посева | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| PEL         | 288                                   | 1              | 5-6                   | 4-5                                                           | 5,5-5,8 pH<br>0,75 mmhos/cm     | Слегка присыпать |

Производство сеянцев

|              | Стадия 1             | Стадия 2                         | Стадия 3                                  | Стадия 4                                      |
|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Увлажнение   | Уровень 4            | Уровень 3-4                      | Уровень 2-4                               | Уровень 2-4                                   |
| Температура  | 66-82°F<br>(19-28°C) | 68-77°F<br>(20-25°C)             | 68-70°F<br>(20-21°C)                      | 60-62°F<br>(16-17°C)                          |
| Освещенность | Опционально          | 2 500 фут-свечей<br>(26 900 Lux) | 2 500 фут-свечей<br>(26 900 Lux)          | 2 500-5 000 фут-свечей<br>(26 900-53 800 Lux) |
| Подкормки    |                      | Менее 100ppm N<br>(Менее 0.7 EC) | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC) | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC)     |

Применение удобрений

Для предотвращения развития болезней, поливать в первой половине дня, вечером листья растений должны быть сухими.

Ключевые моменты выращивания

Колеус очень чувствителен к высокому содержанию солей в почве, особенно к высокому содержанию солей аммония. На стадии прорастания необходимо поддерживать уровень аммония - менее 10ppm. Регуляторы роста, как правило, не требуются.

Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре                          | pH/EC (1:2) субстрат для выращивания | Подкормки                                 | Длина дня                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| (день) 68-75°F (20-24°C)<br>(ночь) 65-68°F (18-20°C) | 5,8-6,2 pH<br>1,5-2,0 mmhos/cm       | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC) | Факультативный короткий день |

Расчет выхода готовой продукции

| Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон | Регуляторы роста |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------|------------------|
| 306 Pack                  | 1 (ppp)        | 4-5 (неделя)       | Весна | -                |
| 4"/4,5"/Quart             | 1 (ppp)        | 4-5 (неделя)       | Весна | -                |
| 5"/6"/1 Gallon            | 1 (ppp)        | 5-6 (неделя)       | Весна | -                |

Применение удобрений

Будьте осторожны при использовании Augeo и Topflor т.к. они могут изменить цвет листьев.

## Распространенные проблемы

Насекомые вредители: Тля, Мучнистый червец, белокрылка  
Болезни: Альтернариоз, серая гниль, вертициллез, ложная мучнистая роса  
Прочее: Чрезмерное удлинение междоузлий при низком освещении или скученности.

## Дополнительная информация

Возможно чрезмерное вытягивание междоузлий в условиях низкой интенсивности света и скученности. При необходимости, применять Florel (этефон) для усиления ветвления и контроля высоты растений. Эффективная дозировка 300ppm (7,69 мл/литр концентрация д.в. 3,9% или 0,63 мл/литр концентрация д.в. 48%) через 2-3 недели после пикировки. Florel может задерживать цветение. Регуляторы роста (при необходимости): для контроля высоты растений B-Nine/Alar (daminozide) 2.500-5.000ppm (0,3-0,6 г/литр концентрация д.в. 85% или 4,0-8,0 г/литр концентрация д.в. 64%) через 2-3 недели после пикировки. Повторная обработка - если потребуется.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

## Фотографии сорта

---



Coral Candy



Coral Candy



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
+1 800-231-7065 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2026 Ball Horticultural Company